



### قائمة التصنيف لفرز أمراض الجهاز التنفسي في مؤسسات الرعاية الصحية

هذا البروتوكول تمت إجازته في يوم 2020/3/16 وتم تعديله بتاريخ 2020/4/19

أي مريض لديه أعراض تنفسية (كحة، سيلان الأنف، ضيق وسرعة تنفس، آلام في الحلق)، اعطه كمامة ووجهه للمسار التنفسي

التاريخ: ..... الإسم رباعي: .....

النوع: ذكر ( ) أنثى ( ) العمر ( ) يعمل في مؤسسة صحية: ( )

الدرجة	أ. احتمالية التعرض
3	<ul style="list-style-type: none"><li>شخص له تاريخ سفر (قادم من خارج السودان خلال فترة ال 14 يوم السابقة) أو</li><li>مخالط لحالة مؤكدة أو مشتبهة بالإصابة بمرض كوفيد-19 خلال فترة ال 14 يوم السابقة</li></ul>
2	<ul style="list-style-type: none"><li>شخص له تاريخ سفر، مقيم أو زار منطقة إنتشار مجتمعي داخل السودان (حسب إعلان وزارة الصحة ) خلال فترة ال 14 يوم السابقة أو</li><li>كادر طبي ممارس يعمل بمؤسسة صحية</li></ul>
الدرجة	ب. العلامات و الأعراض
2	<ul style="list-style-type: none"><li>ضيق وسرعة في التنفس (جديدة أو زادت حدة)</li></ul>
2	<ul style="list-style-type: none"><li>كحة جافة (جديدة أو زادت حدة)</li></ul>
1	<ul style="list-style-type: none"><li>حمى <math>\leq 38</math> درجة مئوية</li></ul>
1	<ul style="list-style-type: none"><li>وجع حلق أو سيلان أنفي</li></ul>
1	<ul style="list-style-type: none"><li>صداع أو آلام شديدة بالجسم</li></ul>
	المجموع

احسب المجموع الكلي لتقييم حالة المريض:

#### I. في حالة المجموع أكبر من أو يساوي 5:

يعتبر المريض حالة مشتبهة ويجب القيام بالخطوات الآتية:

- حجزه بالمستشفى بقسم العزل المؤقت.
- إستبعاد أي مسببات مرضيه أخرى للأعراض التنفسية أعلاه.
- إخطار المدير الطبي للتواصل مع الجهات المختصة.



## .II إذا كان المريض تقييمه أقل من 5:

- يمكن وصف علاجات طبية حسب الحالة.
- إرساله للعزل المنزلي (الرجوع لبروتوكول الرعاية المنزلية أو بروتوكول الكوادر الصحية إذا كان كادر صحي).
- إعطاء التعليمات والتدابير التي يجب إتباعها خلال فترة العزل.

## .III إذا كان المريض حالته غير مستقرة (يحتاج تنويم) بغض النظر عن درجة التقييم:

- تتم معاملته كحالة مشتبهة وحجزه بالمستشفى بقسم العزل المؤقت.
- إسعاف المريض و علاجه حسب الحالة.
- إخطار المدير الطبي للتواصل مع الجهات المختصة.

### يعرف المخالط المباشر بأنه:

- 1- شخص له إختلاط مباشر مع الإفرازات المعدية لمريض كوفيد19 (الإفرازات التنفسية الناتجة من السعال أو لمس المناديل الورقية المستعملة من قبل المريض) دون وجود وسائل الحماية.  
أو
- 2- شخص كان على إتصال قريب (في مسافة 2متر) ومستمر (لمدة 30 دقيقة او أكثر) مع مريض كوفيد19.

### أمثلة للمخالطين المباشرين:

- شخص يعيش في نفس المنزل مع مريض كوفيد19.
- شخص له إتصال جسدي مباشر مع مريض كوفيد19 (مثلاً السلام باليد).
- شخص تواجد في البيئة المحيطة (فصل دراسي، قاعة اجتماعات، مستشفى، غرفة إنتظار، أخرى) لمريض كوفيد19 لمدة 30 دقيقة أو أكثر في مسافة أقل من 2 متر.

\*يتم الفرز من نقطة الدخول الأولي للمريض إلى المؤسسة الصحية قبل الدخول للحوادث