



قائمة التصنيف لفرز أمراض الجهاز التنفسي في مؤسسات الرعاية الصحية

هذا البروتوكول تمت إجازته في يوم 2020/3/16 وتم تعديله بتاريخ 2020/4/19 ثم بتاريخ 2020/8/6

يجب توجيه أي مريض أو مرافق بلبس كامامة عند دخول المؤسسة الصحية

التاريخ: الإسم رباعي:

النوع: ذكر () أنثى () العمر () يعمل في مؤسسة صحية ()

الدرجة	أ. احتمالية التعرض
3	<ul style="list-style-type: none">● شخص له تاريخ سفر (قادم من خارج السودان خلال فترة ال 14 يوم السابقة) أو● مخالط لحالة مؤكدة أو مشتبهة بالإصابة بمرض كوفيد-19 خلال فترة ال 14 يوم السابقة
2	<ul style="list-style-type: none">● شخص له تاريخ سفر، مقيم أو زار منطقة إنتشار مجتمعي داخل السودان (حسب إعلان وزارة الصحة) خلال فترة ال 14 يوم السابقة أو● كادر طبي ممارس يعمل بمؤسسة صحية
الدرجة	ب. العلامات و الأعراض
2	<ul style="list-style-type: none">● ضيق وسرعة في التنفس (جديد أو زادت حدته)
2	<ul style="list-style-type: none">● كحة جافة (جديدة أو زادت حدتها)
1	<ul style="list-style-type: none">● حمى ≤ 38 درجة مئوية (أو الشكوى من حمى حديثاً)
1	<ul style="list-style-type: none">● وجع حلق أو سيلان أنفي
1	<ul style="list-style-type: none">● صداع أو آلام شديدة بالجسم
1	<ul style="list-style-type: none">● فقدان حاسة الشم أو التذوق أو كلاهما
1	<ul style="list-style-type: none">● أي من أعراض الجهاز الهضمي (إسهال، إستقراغ، غثيان)
	المجموع

إذا كان المريض طفل، قم باستخدام أداة الفرز الخاصة بالأطفال



احسب المجموع الكلي لتقييم حالة المريض:

I. في حالة المجموع أكبر من أو يساوي 5:

يعتبر المريض حالة مشتبهة ويجب القيام بالخطوات الآتية:

- حجزه بالمستشفى بقسم العزل المؤقت.
- إستبعاد أي مسببات مرضيه أخرى للأعراض التنفسية أعلاه.
- إخطار المدير الطبي للتواصل مع الجهات المختصة.

II. إذا كان المريض تقييمه أقل من 5:

- يمكن وصف علاجات طبية حسب الحالة.
- إرساله للعزل المنزلي (الرجوع لبروتوكول الرعاية المنزلية أو بروتوكول الكوادر الصحية إذا كان كادر صحي).
- إعطاء التعليمات والتدابير التي يجب إتباعها خلال فترة العزل.

III. إذا كان المريض حالته غير مستقرة (يحتاج تنويم) لديه أي من الأعراض أعلاه بغض النظر عن درجة التقييم:

- تتم معاملته كحالة مشتبهة وحجزه بالمستشفى بقسم العزل المؤقت.
- إسعاف المريض و علاجه حسب الحالة.
- إخطار المدير الطبي للتواصل مع الجهات المختصة.

يعرف المخالط المباشر بأنه:

- 1- شخص له إختلاط مباشر مع الإفرازات المعدية لمريض كوفيد19 (الإفرازات التنفسية الناتجة من السعال أو لمس المناديل الورقية المستعملة من قبل المريض) دون وجود وسائل الحماية.
أو
- 2- شخص كان على إتصال قريب (في مسافة 2متر) ومستمر (لمدة 30 دقيقة او أكثر) مع مريض كوفيد19.

أمثلة للمخالطين المباشرين:

- شخص يعيش في نفس المنزل مع مريض كوفيد19.
- شخص له إتصال جسدي مباشر مع مريض كوفيد19 (مثلاً السلام باليد).
- شخص تواجد في البيئة المحيطة (فصل دراسي، قاعة اجتماعات، مستشفى، غرفة إنتظار، أخرى) لمريض كوفيد19 لمدة 30 دقيقة أو أكثر في مسافة أقل من 2 متر.

***يتم الفرز من نقطة الدخول الأولي للمريض إلي المؤسسة الصحية قبل الدخول للحوادث**